

2014

MATHEMATICS

( General )

Paper : 6.1

( Linear Algebra and Complex Analysis )

Full Marks : 80

Time : 3 hours

*The figures in the margin indicate full marks  
for the questions*

*Answer either in English or in Assamese*

1. Mention if the statements given below are True or False : 1×10=10

তলত দিয়া উক্তিবোৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ নিৰ্ণয় কৰা :

- (a) Every field is a vector space over any of its subfield.

প্রত্যেক ক্ষেত্রই তাৰ যি কোনো উপক্ষেত্রৰ ওপৰত বৈধিক স্থানৰ সূচনা কৰে।

- (b) If  $W_1$  and  $W_2$  are two subspaces of a vector space  $V$ , then  $W_1 \cup W_2$  is also a subspace of  $V$ .

$W_1$  আৰু  $W_2$  কোনো এক বৈধিক স্থান  $V$ ৰ দুটা উপস্থান হ'লে,  $W_1 \cup W_2$ -ও  $V$ ৰ এটা উপস্থান হ'ব।

- (c) Any set of vectors of a vector space including the zero vector is linearly dependent.

এটা বৈখিক স্থানৰ ভেক্টৰৰ যি কোনো সংহতি এটাত শূন্য ভেক্টৰটো সন্নিবিষ্ট হ'লে, সংহতিটো বৈখিকভাৱে পৰতন্ত্র হ'ব।

- (d) The set  $C = \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}, i = \sqrt{-1}\}$  of all complex numbers is a vector space over  $\mathbb{R}$  with  $B = \{1, i\}$  as basis.

$C = \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}, i = \sqrt{-1}\}$ , আটাইবোৰ জটিল সংখ্যাৰ সংহতি হ'লে ই বাস্তৱ সংখ্যাৰ সংহতি  $\mathbb{R}$  ৰ ওপৰত এক বৈখিক স্থানৰ সৃষ্টি কৰে যাৰ আধাৰ হ'ল  $B = \{1, i\}$ .

- (e) Any two bases of a finite dimensional vector space may contain different numbers of vectors.

সসীম মাত্ৰাৰ বৈখিক স্থান এটাৰ যি কোনো দুটা ভূমিত ভিন্ন সংখ্যক ভেক্টৰ থকাটো সম্ভৱ।

- (f) The set  $S = \{(x, y) \mid x + y = 0, x, y \in \mathbb{R}\}$  is a subspace of the vector space

$$V_2(\mathbb{R}) = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

$S = \{(x, y) \mid x + y = 0, x, y \in \mathbb{R}\}$  সংহতিটো বৈখিক স্থান  $V_2(\mathbb{R}) = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$  ৰ এটা উপস্থান।

- (g) If  $z_1$  and  $z_2$  are any two complex numbers, then

$$\operatorname{Re}(z_1 z_2) = \operatorname{Re}(z_1) \operatorname{Re}(z_2)$$

$\operatorname{Re}(z_1)$ ,  $\operatorname{Re}(z_2)$  denoting the real parts of the complex numbers  $z_1$  and  $z_2$  respectively.

$z_1$  আৰু  $z_2$  যি কোনো দুটা জটিল সংখ্যা হ'লে

$$\operatorname{Re}(z_1 z_2) = \operatorname{Re}(z_1) \operatorname{Re}(z_2)$$

য'ত  $\operatorname{Re}(z_1)$  আৰু  $\operatorname{Re}(z_2)$  ক্ৰমে  $z_1$  আৰু  $z_2$  জটিল সংখ্যা দুটাৰ বাস্তৱ অংশ।

- (h) The function  $f(z) = \bar{z}$  is analytic everywhere in the complex plane.

$f(z) = \bar{z}$  ফলনটো জটিল সমতলৰ সকলোতে বৈশ্লেষিক।

- (i) If  $z = x + iy$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$ , then  $f(z) = \log z$  is a many-valued function.

$z = x + iy$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$  ৰ বাবে  $f(z) = \log z$  এটা বহু মানবিশিষ্ট ফলন।

- (j) If  $a$  and  $z$  are any two points in a simply connected domain  $D$  in the complex plane  $\mathbb{C}$ , then  $\int_a^z f(z) dz$  depends on the paths joining  $a$  and  $z$ , where  $f(z)$  is analytic in  $D$ .

জটিল সমতল  $\mathbb{C}$ ত বিবেচনা কৰা এটা একসংযোগীক্ষেত্ৰ  $D$ ৰ বাবে  $a, z \in D$  হ'লে,  $\int_a^z f(z) dz$ ৰ মান  $a$  আৰু  $z$  সংযোগী পথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, য'ত  $f(z)$  ফলনটো  $D$  ক্ষেত্ৰত বৈশ্লেষিক।

- (iv) Give the definition of the complex line integral  $\int_C f(z) dz$ , where  $f(z)$  is continuous for all  $z$  on the rectifiable curve  $C$  of finite length.

জটিল বেখা-সমাকল  $\int_C f(z) dz$  ৰ সংজ্ঞা লিখা, য'ত  $f(z)$  সসীম দৈৰ্ঘ্যৰ একমুখীকৰণযোগ্য এটা বক্র  $C$  ৰ ওপৰত থকা সকলো বিন্দু  $z$  ত অবিচ্ছিন্ন।

- (v) Calculate  $\int_C \bar{z} dz$  from  $z=0$  to  $z=4+2i$  along the curve  $C$  given by

$$z = t^2 + it$$

$z = t^2 + it$  য়ে নিৰ্দেশ কৰা এটা বক্র  $C$  ৰে  $z=0$  ৰ পৰা  $z=4+2i$  লৈ  $\int_C \bar{z} dz$  ৰ মান উলিওৱা।

3. (a) Answer any two of the following questions : 5×2=10

তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ যি কোনো দুটাৰ উত্তৰ লিখা :

- (i) Let  $W_1$  and  $W_2$  be two subspaces of a vector space  $V(F)$ . Define linear sum  $W_1 + W_2$  and prove that  $W_1 + W_2$  is a subspace of  $V(F)$ .

ধৰা হ'ল,  $W_1$  আৰু  $W_2$  এটা বৈখিক স্থান  $V(F)$  ৰ দুটা উপস্থান। বৈখিক সমষ্টি  $W_1 + W_2$  ৰ সংজ্ঞা লিখা আৰু প্ৰমাণ কৰা যে  $W_1 + W_2$ ,  $V(F)$  ৰ এটা উপস্থান।

- (ii) Define linear span  $L(S)$  for any finite subset  $S$  of a vector space  $V(F)$ . Show that the linear span  $L(S)$  of a finite set  $S$  in a vector space  $V(F)$  is a subspace of  $V(F)$ .

এটা বৈধিক স্থান  $V(F)$  ৰ যি কোনো সসীম উপসংহতি  $S$  ৰ বাবে বৈধিক বিস্তাৰ  $L(S)$  ৰ সংজ্ঞা লিখা। দেখুওৱা যে, বৈধিক স্থান  $V(F)$  ৰ যি কোনো সসীম সংহতি  $S$  ৰ বৈধিক বিস্তাৰ  $L(S)$ ,  $V(F)$  ৰ এটা উপস্থান।

- (iii) Show that the set

$$S = \{(2, -1, 0), (3, 5, 1), (1, 1, 2)\}$$

forms a basis for the vector space  $\mathbb{R}^3(\mathbb{R})$ .

দেখুওৱা যে

$$S = \{(2, -1, 0), (3, 5, 1), (1, 1, 2)\}$$

সংহতিটো বৈধিক স্থান  $\mathbb{R}^3(\mathbb{R})$  ৰ বাবে এক আধাৰ।

- (b) Answer any two of the following questions : 5×2=10

তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ যি কোনো দুটাৰ উত্তৰ লিখা :

- (i) If  $f(z)$  is analytic with its derivative  $f'(z)$  continuous at all points inside and on a simple closed curve  $C$ , prove that

$$\int_C f(z) dz = 0$$

যদি  $f(z)$  ফলনটো বৈশ্লেষিক আৰু ইয়াৰ অৱকলজ  $f'(z)$  সৰলভাৱে আবদ্ধ এটা বক্র  $C$ ৰ অন্তৰ্ভাগকে ধৰি ইয়াৰ ওপৰৰ সকলো বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন, তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে,

$$\int_C f(z) dz = 0$$

(ii) Prove that

$$\int_C \frac{dz}{z-a} = 2\pi i$$

where  $C$  is any simple closed curve containing the point  $z=a$  in the region bounded by  $C$ .

প্ৰমাণ কৰা যে

$$\int_C \frac{dz}{z-a} = 2\pi i$$

য'ত  $C$  এটা সৰলভাৱে আবদ্ধ বক্র আৰু  $z=a$ ,  $C$ ৰ দ্বাৰা আবদ্ধ ক্ষেত্ৰৰ এটা যি কোনো বিন্দু।

(iii) Evaluate

$$\int_C (x^2 - iy^2) dz$$

along the parabola  $y = 2x^2$  from  $(1, 1)$  to  $(2, 8)$ .

$\int_C (x^2 - iy^2) dz$  ৰ মান উলিওৱা, য'ত  $C$  য়ে

অধিবৃত্ত  $y = 2x^2$ ৰ  $(1, 1)$ ৰ পৰা  $(2, 8)$  লৈ অংশটোক নিৰ্দেশ কৰে।

4. Let  $T: U(F) \rightarrow V(F)$  be a linear transformation from a vector space  $U(F)$  into another vector space  $V(F)$ . Define the null space and range space of  $T$ . Prove that both null space and range space of  $T$  are subspaces of  $U(F)$  and  $V(F)$  respectively. 2+4+4=10

ধৰা হ'ল,  $T: U(F) \rightarrow V(F)$ , বৈখিক স্থান  $U(F)$  ৰ পৰা আন এক বৈখিক স্থান  $V(F)$  লৈ এটা বৈখিক ৰূপান্তৰণ।  $T$  ৰ শূন্যস্থান আৰু পৰিসৰ স্থানৰ সংজ্ঞা লিখা। প্রমাণ কৰা যে,  $T$  ৰ শূন্যস্থান আৰু পৰিসৰ স্থান উভয়ে ক্ৰমে  $U(F)$  আৰু  $V(F)$  ৰ উপস্থান।

Or / অথবা

Let  $T: U(F) \rightarrow V(F)$  be a linear transformation from a vector space  $U(F)$  into a vector space  $V(F)$ . Then show that (a)  $T(0) = 0$ , where 0 denotes the zero vector of vector space in the appropriate context and (b)  $T(-\alpha) = -T(\alpha)$ ,  $\forall \alpha \in U(F)$ . 5+5=10

ধৰা হ'ল,  $T: U(F) \rightarrow V(F)$ , বৈখিক স্থান  $U(F)$  ৰ পৰা  $V(F)$  লৈ এটা বৈখিক ৰূপান্তৰণ। দেখুওৱা যে, (ক)  $T(0) = 0$ , য'ত 0 য়ে যথাযোগ্য প্ৰসংগ সাপেক্ষে বৈখিক স্থানৰ শূন্যক নিৰ্দেশ কৰে আৰু (খ)  $T(-\alpha) = -T(\alpha)$ ,  $\forall \alpha \in U(F)$ ।

5. What do you mean by the normal form of an  $m \times n$  matrix  $A$  of rank  $r$ ? Find the rank of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 3 & 8 \\ 4 & 2 & 6 & -1 \\ 10 & 3 & 9 & 7 \\ 16 & 4 & 12 & 15 \end{bmatrix}$$

by reducing it into normal form.

2+8=10

$r$  কোটিযুক্ত এটা  $m \times n$  মৌলকক্ষ  $A$ ৰ প্ৰসামান্য আকাৰ বুলিলে কি বুজা? প্ৰসামান্য আকাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰি

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 3 & 8 \\ 4 & 2 & 6 & -1 \\ 10 & 3 & 9 & 7 \\ 16 & 4 & 12 & 15 \end{bmatrix}$$

মৌলকক্ষৰ কোটি নিৰ্ণয় কৰা।

Or / অথবা

Let  $L(U, V)$  denote the set of all linear transformations from a vector space  $U$  into another vector space  $V$  defined over the same field  $F$ . For any  $T_1, T_2 \in L(U, V)$ ,  $\alpha \in U$ ,  $a \in F$ , define

$$(T_1 + T_2)(\alpha) = T_1(\alpha) + T_2(\alpha)$$

$$(aT_1)(\alpha) = aT_1(\alpha)$$

Prove that  $L(U, V)$  is a vector space over  $F$ . 10

ধৰা হ'ল,  $L(U, V)$  য়ে একেটা ক্ষেত্ৰ  $F$ ৰ ওপৰত সংজ্ঞাবদ্ধ বৈখিক স্থান  $U$ ৰ পৰা বৈখিক স্থান  $V$  লৈ আটাইবোৰ বৈখিক ৰূপান্তৰণৰ সংহতি। যি কোনো  $T_1, T_2 \in L(U, V)$ ,  $\alpha \in U$ ,  $a \in F$ ৰ বাবে  $T_1 + T_2$  আৰু  $aT_1$ ৰ সংজ্ঞা এনেদৰে দিয়া হ'ল

$$(T_1 + T_2)(\alpha) = T_1(\alpha) + T_2(\alpha)$$

$$(aT_1)(\alpha) = aT_1(\alpha)$$

প্ৰমাণ কৰা যে,  $L(U, V)$  য়ে  $F$ ৰ ওপৰত এটা বৈখিক স্থানৰ সূচনা কৰে।

6. Define eigenvalue and eigenvector of an  $n \times n$  matrix  $A$  over the field of reals ( $\mathbb{R}$ ). Show that every square matrix  $A$  satisfies its own characteristic equations. 2+8=10

বাস্তৱ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰ  $\mathbb{R}$  ত বিবেচনা কৰা এটা  $n \times n$  মৌলকক্ষ  $A$  ৰ আইগেন মান আৰু আইগেন ভেক্টৰৰ সংজ্ঞা আগবঢ়োৱা। দেখুওৱা যে প্ৰত্যেক বৰ্গ মৌলকক্ষ  $A$  য়ে তাৰ নিজৰ আভিলক্ষণিক সমীকৰণক সিদ্ধ কৰে।

Or / অথবা

Verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

and hence find  $A^{-1}$ . 6+4=10

মৌলকক্ষ  $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$  ৰ বাবে কেইলি-হেমিণ্টন

উপপাদ্যটো প্ৰত্যায়িত কৰা আৰু ইয়াৰ পৰা  $A^{-1}$  নিৰ্ণয় কৰা।

7. Prove that the necessary and sufficient conditions for a complex function

$$W = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

to be analytic in a region  $R$  are

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{and} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

where all partial derivatives are assumed continuous on  $R$ . 4+6=10

এটা জটিল ফলন

$$W = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

জটিল সমতলৰ  $R$  ক্ষেত্ৰত বৈশ্লেষিক হোৱাৰ চৰ্তসমূহ হ'ল

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ আৰু } \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

প্ৰমাণ কৰা যে, এই চৰ্তসমূহ প্ৰয়োজনীয় আৰু পৰ্যাপ্ত য'ত  
আংশিক অৱকলনসমূহক  $R$  ত অবিচ্ছিন্ন বুলি ধৰা হৈছে।

Or / অথবা

Prove that

$$u = e^{-x}(x \sin y - y \cos y)$$

is harmonic and find  $v$  such that  $f(z) = u + iv$  is  
analytic.

5+5=10

প্ৰমাণ কৰা যে

$$u = e^{-x}(x \sin y - y \cos y)$$

বাস্তৱ ফলনটো সমঞ্জস আৰু এটা বাস্তৱ ফলন  $v$  নিৰ্ণয় কৰা  
যাতে  $f(z) = u + iv$  ফলনটো বৈশ্লেষিক হয়।

\*\*\*