

63/1 (SEM-3) (GE3/DSC)
MATHG/RC3036

2 0 2 2

(Held in 2023)

MATHEMATICS

Paper : MATHG/RC3036

(**Real Analysis**)

Full Marks : 80

Pass Marks : 32

Time : 3 hours

*The figures in the margin indicate full marks
for the questions*

1. Choose the correct option : 1×6=6

সঠিক উত্তৰটো বাছি উলিওৱা :

(a) The set of all ordered pairs of integers is

অখণ্ড সংখ্যাৰ সকলো ক্ৰমিক যোৰৰ সংহতি হ'ল

(i) finite

সসীম

(ii) denumerable

সীমা নোহোৱাকৈ গণনীয়

(iii) uncountable

অগণনীয়

(iv) None of the above

ওপৰৰ এটাও নহয়

(2)

(b) A : The series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ is convergent.

A : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ শ্রেণীটো অভিসারী।

B : The series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ is divergent.

B : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ শ্রেণীটো অপসারী।

Then

তেজ্ঞে

(i) A and B both are false

A আৰু B উভয়ে শুদ্ধ নহয়

(ii) A and B both are true

A আৰু B উভয়ে শুদ্ধ হয়

(iii) A is true but B is false

A শুদ্ধ হয় কিন্তু B অশুদ্ধ

(iv) A is false but B is true

A অশুদ্ধ হয় আৰু B শুদ্ধ

(c) Every non-empty set of real numbers which has a lower bound has

বাস্তৱ সংখ্যাৰ প্ৰত্যেক অবিক্ত সংহতি যাব নিম্ন পৰিবদ্ধ আছে, তাত পোৱা যায়

(i) a supremum

এটা নিম্নতম উচ্চ পৰিবদ্ধ

(3)

(ii) an infimum

এটা উচ্চতম নিম্ন পৰিবদ্ধ

(iii) neither infimum nor supremum

উচ্চতম নিম্ন পৰিবদ্ধ আৰু নিম্নতম উচ্চ পৰিবদ্ধ কোনোটোৱেই নহয়

(iv) both infimum and supremum

উচ্চতম নিম্ন পৰিবদ্ধ আৰু নিম্নতম উচ্চ পৰিবদ্ধ দুয়োটা আছে

(d) The empty set is

বিক্ত সংহতি

(i) bounded

পৰিবদ্ধ হয়

(ii) unbounded

অপৰিবদ্ধ হয়

(iii) Both bounded and unbounded

পৰিবদ্ধ আৰু অপৰিবদ্ধ দুয়োটা হয়

(iv) neither bounded nor unbounded

পৰিবদ্ধ আৰু অপৰিবদ্ধ দুয়োটা নহয়

(e) The series $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ is

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ শ্রেণীটো

(i) conditionally convergent

চৰ্তাধীন অভিসারী

(4)

(ii) absolutely convergent

চৰম অভিসাৰী

(iii) divergent

অপসাৰী

(iv) None of the above

ওপৰৰ এটাও নহয়

(f) If $E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ be a function defined by a power series, then

যদি $E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ যাত শ্ৰেণীৰে নিৰ্ধাৰ কৰা

ফলন হয়, তেন্তে

(i) $E(1) < 2$

(ii) $E(1) > 3$

(iii) $E(1) = e$

(iv) $E(1) = \frac{1}{e}$

2. Answer the following questions : 2×5=10

তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Show that the smallest member of a set, if it exists, is the infimum of the set.

দেখুওৱা যে এটা সংহতিৰ নিম্নতম মৌল, যদি ই হিঁত হয়, ই সংহতিটোৰ উচ্চতম নিম্ন পৰিৰদ্ধ।

(5)

(b) Define Cauchy sequence. Write the condition where every Cauchy sequence is convergent.

কচি অনুক্রমৰ সংজ্ঞা দিয়া। সকলো কচি অনুক্রম অভিসাৰী হোৱাৰ চৰ্ত লিখা।

(c) Show that every absolutely convergent series is convergent.

দেখুওৱা যে সকলো চৰম অভিসাৰী শ্ৰেণী অভিসাৰী হয়।

(d) Show that the sequence

$$\left\{ a_n^{\frac{1}{n}} \right\}$$

where $a_n = \frac{|3n|}{(|n|)^3}$ is convergent and find

its limit.

দেখুওৱা যে $\{a_n^{\frac{1}{n}}\}$ য'ত $a_n = \frac{|3n|}{(|n|)^3}$ অনুক্রমটো

অভিসাৰী আৰু ইয়াৰ সীমা উলিওৱা।

(e) Prove that the sequence $\left\langle \frac{2n-7}{3n+2} \right\rangle$ is monotonically increasing.

প্ৰমাণ কৰা যে $\left\langle \frac{2n-7}{3n+2} \right\rangle$ অনুক্রমটো একদিষ্ট বৰ্ধমান।

3. Answer any six of the following questions :

5×6=30

তলৰ যি কোনো ছয়টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Prove that the Cartesian product of two countable sets is countable.

প্ৰমাণ কৰা যে দুটা সংহতিৰ গণনীয় সংহতিৰ কাৰ্টেছিয় গুণফল গণনীয় হয়।

(b) Prove that a sequence cannot converge to more than one limit.

প্ৰমাণ কৰা যে এটা অনুক্রমত এটাতকৈ অধিক সীমাত অভিসৰণ কৰিব নোৱাৰে।

(c) Applying squeeze theorem, prove that

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1$$

স্কোৱাজ উপপাদ্য প্ৰয়োগ কৰি প্ৰমাণ কৰা যে

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1$$

(d) Show that the series

$$\frac{1 \cdot 2}{3^2 \cdot 4^2} + \frac{3 \cdot 4}{5^2 \cdot 6^2} + \frac{5 \cdot 6}{7^2 \cdot 8^2} + \dots$$

is convergent.

দেখুওৱা যে

$$\frac{1 \cdot 2}{3^2 \cdot 4^2} + \frac{3 \cdot 4}{5^2 \cdot 6^2} + \frac{5 \cdot 6}{7^2 \cdot 8^2} + \dots$$

শ্ৰেণীটো অভিসাৰী হয়।

(e) Show that the sequence $\{f_n\}$, where $f_n(x) = \tan^{-1} nx$, $x \geq 0$ is uniformly convergent in any interval $[a, b]$, $a > 0$ but is only point-wise convergent in $[0, b]$.

দেখুওৱা যে অনুক্রম $\{f_n\}$ যি কোনো অন্তৰাল $[a, b]$, $a > 0$ ত সমভাবে অভিসাৰী হয় কিন্তু কেৱলমাত্ৰ $[0, b]$ অন্তৰালত বিন্দুভাৱে অভিসাৰী হয়, য'ত $f_n(x) = \tan^{-1} nx$, $x \geq 0$.

(f) Define M_n -test and show that the sequence $\{f_n\}$, where

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2},$$

is not uniformly convergent on any interval containing zero.

M_n -পৰীক্ষা ব্যাখ্যা কৰা আৰু দেখুওৱা যে $\{f_n\}$ অনুক্রমটো শূন্য অন্তৰ্ভুক্ত যি কোনো অন্তৰালত সমভাবে অভিসাৰী নহয় য'ত

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$$

(g) Show that the sequence $\{S_n\}$ is convergent and that $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ lies between 2 and 3 where $S_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

দেখুওৱা যে $\{S_n\}$ অনুক্রমটো অভিসাৰী হয় আৰু

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ৰ মান 2 আৰু 3ৰ মাজত থাকে য'ত

$$S_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

- (h) Define power series and find the radius of convergence of the power series

$$x + \frac{x^2}{2^2} + \frac{|2|}{3^3} x^3 + \frac{|3|}{4^4} x^4 + \dots$$

যাত শ্ৰেণী ব্যাখ্যা কৰা আৰু

$$x + \frac{x^2}{2^2} + \frac{|2|}{3^3} x^3 + \frac{|3|}{4^4} x^4 + \dots$$

যাত শ্ৰেণীটোৰ অভিসৰণ ব্যাসাৰ্ধ উলিওৱা।

- (i) Prove that

প্ৰমাণ কৰা যে

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}}{n} = 0$$

4. Answer any two of the following questions :

10×2=20

তলৰ যি কোনো দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) If a sequence $\{f_n\}$ converges uniformly to f on $[a, b]$ and each function f_n is integrable, then prove that f is

integrable on $[a, b]$ and the sequence

$\left\{ \int_a^x f_n dt \right\}$ converges uniformly to $\int_a^x f dt$

on $[a, b]$ i.e.,

$$\int_a^x f dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f_n dt \quad \forall x \in [a, b]$$

যদি $\{f_n\}$ অনুক্রম এটা $[a, b]$ অন্তৰালত f লৈ সমভাবে অভিসাৰী হয় আৰু প্ৰত্যেক f_n ফলন অনুকলনীয় হয়,

তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে $[a, b]$ অন্তৰালত f অনুকলনীয়

হ'ব আৰু $\left\{ \int_a^x f_n dt \right\}$ অনুকলনটো $[a, b]$ অন্তৰালত

$\int_a^x f dt$ লৈ সমভাবে অভিসৰণ কৰে অৰ্থাৎ

$$\int_a^x f dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f_n dt \quad \forall x \in [a, b]$$

- (b) If $\sum u_n$ is a positive term series such that $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n)^{\frac{1}{n}} = l$, prove that the series

converges if $l < 1$ and diverges if $l > 1$ but if $l = 1$, then what information can we get about the series, discuss with examples.

যদি $\sum u_n$ ধনাত্মক পদ শ্ৰেণী হয় যাতে

$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n)^{\frac{1}{n}} = l$, তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে শ্ৰেণীটো

অভিসৰণ কৰে, যদি $l < 1$ হয় আৰু অপসৰণ কৰে যদি

$l > 1$ হয় কিন্তু যদি $l = 1$ হয়, তেন্তে শ্ৰেণীটোৰ বিষয়ে

কি আভাস পোৱা যায়, উদাহৰণৰ সহায়ত আলোচনা কৰা।

(c) Prove that the set of rational numbers is not order-complete.

প্রমাণ কৰা যে পৰিমেয় সংখ্যাৰ সংহতিটো ক্ৰম-সম্পূৰ্ণ নহয়।

5. (a) Test the convergency of the following :

তলত দিয়াবোৰৰ অভিসৰণ পৰীক্ষা কৰা :

(i) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 \log n}$ 4

(ii) $\frac{x}{1 \cdot 2} + \frac{x^2}{2 \cdot 3} + \frac{x^3}{3 \cdot 4} + \frac{x^4}{4 \cdot 5} + \dots, x > 0$ 5

(b) Prove that every Cauchy sequence is bounded. 5

প্রমাণ কৰা যে সকলো কচি অনুক্রম পৰিৱদ্ধ হয়।

Or / নাইবা

(a) Define : 2+2=4

সংজ্ঞা দিয়া :

(i) Countable and uncountable sets
গণনীয় আৰু অগণনীয় সংহতি

(ii) Bounded and unbounded sequence
পৰিৱদ্ধ আৰু অপৰিৱদ্ধ অনুক্রম

(b) Prove that

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \dots$$

is not absolutely convergent. 5

প্রমাণ কৰা যে

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \dots$$

চৰম অভিসাৰী নহয়।

(c) Prove that if

$$f_n = \frac{1}{n} \{(n+1)(n+2)\dots(n+n)\}^{\frac{1}{n}}$$

then the sequence $\langle f_n \rangle$ converges to $\frac{4}{e}$. 5

প্রমাণ কৰা যে যদি

$$f_n = \frac{1}{n} \{(n+1)(n+2)\dots(n+n)\}^{\frac{1}{n}}$$

তেহে $\langle f_n \rangle$ অনুক্রমটো $\frac{4}{e}$ লৈ অভিসৰণ কৰে।
